



Mataballos de pico liso
Crotophaga ani
Villarrica (Reg. Araucanía)
31 de Mayo 2020
Foto: Diego Villagrán

Resumen de Avistamientos

Enero – Diciembre 2020

por Rodrigo Barros y la Red de Observadores de Aves

Estos son algunos de los avistamientos más interesantes que se hicieron en Chile, entre los meses de Enero y Diciembre de 2020, y que llegaron principalmente a través de la base de datos eBird, administrada en el país por la ROC.

Si haces observaciones de aves, tus datos siempre serán muy bienvenidos. Para enviar tus avistamientos, te invitamos a utilizar el sistema eBird. Con eBird puedes organizar tus registros, dejando que estos datos sean accesibles a los ornitólogos, científicos y conservacionistas que los necesiten.

Mientras más información agregues a tus avistamientos, como cantidad, edad, sexo o comportamiento de reproducción, más interesantes y útiles serán tus datos.

Para este resumen se utilizaron los avistamientos de los siguientes 141 observadores:

Jorge Abarca,	Daniel Díaz,	Andrew Mack,	Juan Pablo Rider,
Ana Alayan,	Fernando Díaz,	Mario Madrid,	Juan Guillermo Rojas,
Carolina Allendes,	Joel Díaz,	Milena Maira,	SAG de Arica,
Virginia Alvarado,	Luis Felipe Escobar,	Pio Marshall,	Andrea Salas,
Arturo Alvestegui,	Juan Figueroa,	Daniel Martínez,	Franco Salgado,
Víctor Antillanca,	Mario Figueroa,	Pablo Martínez,	Natacha Sánchez,
Nicolás Araya,	Edwin French,	Cliff Mastrangelo,	Erik Sandvig,
Verónica Araya,	Jorge Fuentes,	Alonso Matus,	Jürgen Schulmeister,
Carlos Arriagada,	Jorge Galaz,	Antonio Matus,	Rodrigo Seiffert,
José Arriagada,	Pablo Galdames,	Ricardo Matus,	Luke Seitz,
Cristian Asun,	Benjamín Gallardo,	Patricio Medalla,	Rodrigo Silva,
Juan Baeza,	Ana García-Cegarra,	Marcelo Miranda,	Ivo Tejada,
Rodrigo Barros,	Betsy Garrett,	Sharon Montecino,	Jorge Toledo,
Jean Bickal,	Oscar Gibbons,	Jim Moore,	Javiera Toro,
Olivia Blank,	Felipe González,	Rodrigo Moraga,	Hederd Torres,
José Luis Brito,	Natacha González,	Charly Moreno,	Marcelo Torrejón,
Ted Cable,	Rodrigo González,	Eduardo Navarro,	Rodrigo Torrejón,
Ariel Cabrera,	Rosario Guardiola,	Heraldo Norambuena,	Diego Tureo,
Francisco Cantero,	Bianca Guggiana,	Cristofer Ojeda,	Felipe Undurraga,
Felipe Cáceres,	Michel Gutiérrez,	Freddy Olivares,	Vicente Valdés,
Pablo Cárcamo,	Pablo Gutiérrez,	Marcelo Olivares,	Gilda Valderrama,
Gastón Cassus,	Valeria Hidalgo,	Eduardo Opazo,	Carolina Vargas,
Francisco Castro,	Mary Hooper,	Rodrigo Ortega,	Jorge Velásquez,
Oscar Chacón,	Michael Hooper,	Oscar Osorio,	Salvador Velásquez,
Enrique Chaura,	Marcin Horbatowski,	Ricardo Oyarzún,	Jorge Vidal,
Santiago Cereceda,	Luk Hostens,	Nelson Palma,	Diego Villagrán,
Mauricio Cisternas,	Saskia Hostens,	Vicente Pantoja,	Esteban Villanueva,
Michael Collins,	Steve Howell,	Diego Peñaloza,	Edge Wade,
Nelson Contardo,	Daniel Imbernón,	Ronny Peredo,	Clare Wheeler,
Juan Mauricio Contreras,	Santiago Imberti,	Cristián Pinto,	José Tomás Yakasovic,
Antonia Cornejo,	Francisca Irarrázabal,	César Piñones,	Ignacio Yanca,
Lucía Cristi,	Fidel Lara,	Felipe Plaza,	Paloma Yávar,
Carlos Cullen,	Paloma Lazo,	Camilo Poblete,	Kirk Zufelt.
Paulo Dávalos,	Jean Leonatti,	Gabriel Pulgar,	
Cristofer de la Rivera,	Julio Llanos,	Sebastián Retamal,	
Roberto Delgado,	Esteban López,	Rodrigo Reyes,	

ARRIBA:

Pato crestudo

Sarkidiornis sylvicola

Desembocadura del río Lluta

(Reg. Arica y Parinacota)

11 de Noviembre 2020

FOTO: Verónica Araya

ARRIBA-IZQUIERDA:

Pato de alas azules

Spatula discors

Laguna Batuco

(Reg. Metropolitana)

10 de Diciembre 2020

FOTO: Pablo Martínez

ABAJO-DERECHA:

Pato de alas azules

Spatula discors

Laguna Petrel, Pichilemu

(Reg. O'Higgins)

14 de Agosto 2020

FOTO: Carolina Miranda



Pato crestudo (*Sarkidiornis sylvicola*): Destaca la observación de una hembra en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota), entre el 09 y 11.11 (V. Araya, J. Díaz, F. Lara, R. Peredo, G. Pulgar), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Pato de alas azules (*Spatula discors*): Una pareja está presente en la Laguna Batuco (Reg. Metropolitana), con al menos un ejemplar observado entre el 10 y 29.12 (E. French, P. Galdames, P. Martínez, G. Valderrama, *et al.*); y nuevamente se observa un macho en la Laguna Petrel, Pichilemu (Reg. O'Higgins) el 14 y 15.08 (P. Yávar, C. Allendes, M. Miranda).

ARRIBA:

Parina chica

Phoenicoparrus jamesi

Humedal de Pichicuy

(Reg. Valparaíso)

17 de Octubre 2020

FOTO: José Tomás Yakasovic

ABAJO

Pimpollo tobiano

Podiceps gallardoi

Laguna Blanca, Villa Tehuelche

(Reg. Magallanes)

26 de Noviembre 2020

FOTO: Oscar Gibbons



Flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*): El 20.12 se encuentra una colonia activa de a lo menos 8 nidos en la estepa patagónica de la comuna de San Gregorio (Reg. Magallanes), correspondiendo al evento reproductivo más austral conocido para esta especie (R. Matus, A. Matus, A. Matus, O. Blank). Más detalles de este registro se pueden leer en un artículo de este mismo número de **La Chiricoca** (pág. 06).

Parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*): Lejos de su hábitat regular en el país, un ejemplar se observa en el humedal de Pichicuy (Reg. Valparaíso) entre el 10 y 26.10 (M. Collins, et al.).

Pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*): Entre uno y tres ejemplares son observados en Laguna Blanca, Villa Tehuelche (Reg. Magallanes) el 26 y 28.11 (O. Gibbons, C. Asun, S. Imberti).

IZQUIERDA:

Matacaballos de pico liso

Crotophaga ani

Sector de Tacamó, Osorno

(Reg. Los Lagos)

03 de Mayo 2020

FOTO: Cristófer Ojeda

CENTRO:

Guácharo

Steatornis caripensis

Arica

(Reg. Arica y Parinacota)

08 de Marzo 2020

FOTO: SAG de Arica

DERECHA:

Picaflor chico

Sephanoides sephanioides

Chaca

(Reg. Arica y Parinacota)

05 de Marzo 2020

FOTO: Rodrigo Reyes

ABAJO:

Ñacundá


Chordeiles nacunda

Desembocadura del río Lluta

(Reg. Arica y Parinacota)

10 de Octubre 2020

FOTO: Jorge Fuentes



Matacaballos de pico liso (*Crotophaga ani*): Destaca la observación de un ejemplar en Villarrica (Reg. Araucanía), entre el 07 y 31.05 (D. Villagrán, S. Retamal, J. Toro), y otro más en el sector de Tacamó, Osorno (Reg. Los Lagos), entre el 01 y 09.05 (C. Ojeda, P. Cárcamo); correspondiendo a los primeros registros de esta especie en Chile.

Ñacundá (*Chordeiles nacunda*): Se observa un ejemplar en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) entre el 10 y 19.10 (J. Fuentes, J. Abarca, V. Araya, F. González, R. Guardiola, G. Pulgar), correspondiendo al primer registro de esta especie en el país.

Guácharo (*Steatornis caripensis*): Un ejemplar es encontrado volando débilmente cerca de un conjunto de departamentos en la ciudad de Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 08.03, siendo entregado al SAG de Arica. En la mañana del día siguiente, el ave fue liberada en una pampa desértica al sur de la ciudad (información SAG de Arica), correspondiendo al quinto registro conocido de esta especie en el país.

Picaflor chico (*Sephanoides sephanioides*): Bastante al norte de su rango habitual en el país, un macho es fotografiado en Chaca (Reg. Arica y Parinacota) el 05.03 (R. Reyes).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Tagua andina
Fulica ardesiaca
Embalse de La Luz, Curauma
(Reg. Valparaíso)
18 de Septiembre 2020
FOTO: Nelson Palma



ABAJO-IZQUIERDA:

Jacana
Jacana jacana
Guapi, costa de Corral
(Reg. Los Ríos)
20 de Julio 2020
FOTO: Enrique Chaura



DERECHA:

Carau
Aramus guarauna
Loncoche
(Reg. Araucanía)
05 de Julio 2020
FOTO: Rodrigo Seiffert



Tagua andina (*Fulica ardesiaca*): Lejos de su distribución habitual en el país, nuevamente se observa un ejemplar en el embalse de La Luz, Curauma (Reg. Valparaíso) el 17 y 18.09 (C. Poblete, N. Palma), probablemente el mismo informado en el «Resumen de Avistamientos» de **La Chiricoca 26**.

Jacana (*Jacana jacana*): Un juvenil es observado en el sector de Guapi, costa de la comuna de Corral (Reg. Los Ríos) el 20.07, y durante aproximadamente dos semanas (E. Chaura), correspondiendo al cuarto registro documentado de esta especie para Chile.

Carau (*Aramus guarauna*): Un ejemplar es fotografado al oriente de Loncoche (Reg. Araucanía) el 05.07 (R. Seiffert), correspondiendo al segundo registro de esta especie en Chile.

ARRIBA-IZQUIERDA:

Zarapito polinésico

Numenius tahitiensis

Sector Akahanga, Rapa Nui

(Reg. Valparaíso)

28 de Enero 2020

FOTO: Cliff Mastrangelo

ABAJO-IZQUIERDA:

Playero grande semipalmata

Tringa semipalmata semipalmata

Desembocadura del río Maipo

(Reg. Valparaíso)

06 de Febrero 2020

FOTO: Steve Howell

CENTRO:

Pitotoy solitario

Tringa solitaria

Humedal del Salar del Carmen

(Reg. Antofagasta)

17 de Octubre 2020

FOTO: Charly Moreno

ARRIBA-DERECHA:

Playero canela

Calidris subruficollis

Pica

(Reg. Tarapacá)

25 de Octubre 2020

FOTO: Juan Figueroa

ABAJO-DERECHA:

Zarapito moteado

Limosa fedoa

Desembocadura del estero Tongoy

(Reg. Coquimbo)

21 de Noviembre 2020

FOTO: Charly Moreno



Zarapito polinésico (*Numenius tahitiensis*): Nuevamente es fotografiado un ejemplar en Rapa Nui (Reg. Valparaíso), en el sector Akahanga el 28.01 (J. Llanos, C. Mastrangelo), y en el sector Vaihu, Anakena el 10.02 (A. Salas).

Zarapito moteado (*Limosa fedoa*): Permanece un ejemplar en la desembocadura del estero Tongoy (Reg. Coquimbo) entre el 11.01 y el 08.03 (R. Barros, H. Norambuena, C. Pinto, *et al.*); y probablemente el mismo ejemplar se vuelve a observar en el mismo sitio entre el 17.10 y el 03.12 (M. Torrejón, R. González, D. Imbernón, C. Moreno, F. Plaza, E. Sandvig, I. Tejada).

Playero canela (*Calidris subruficollis*): Un ejemplar es fotografiado en la planta de tratamiento de aguas servidas de Pica (Reg. Tarapacá) el 25.10 (J. Figueroa), correspondiendo a uno de los pocos registros de la especie en el país.

Pitotoy solitario (*Tringa solitaria*): Un ejemplar es observado en el humedal del Salar del Carmen (Reg. Antofagasta) el 17.10 (J. Baeza, C. Moreno), correspondiendo a uno de los pocos registros de esta especie en Chile.

Playero grande semipalmata (*Tringa semipalmata semipalmata*): Un ejemplar es fotografiado en la desembocadura del río Maipo (Reg. Valparaíso) el 06.02.2020 (S. Howell, L. Seitz, *et al.*), posiblemente el primer registro documentado para esta subespecie en toda la costa del Pacífico sudamericano.

ARRIBA:

Salteador polar

Stercorarius maccormicki

Pelágico frente a Valparaíso

(Reg. Valparaíso)

14 de Noviembre 2020

FOTO: Fernando Díaz

ABAJO-IZQUIERDA:

Gaviota reidora

Leucophaeus atricilla

Mejillones

(Reg. Antofagasta)

03 de Septiembre 2020

FOTO: Luis Felipe Escobar

ABAJO- DERECHA:

Gaviota reidora

Leucophaeus atricilla

Playa La Rinconada

(Reg. Antofagasta)

21 de Junio 2020

FOTO: Juan Carlos Baeza



Salteador polar (*Stercorarius maccormicki*): Con pocos registros en el país, un ejemplar es registrado en una salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 14.11 (G. Cassus, N. Contardo, L. Cristi, F. Díaz, M. Gutiérrez, M. Maira, D. Martínez, O. Osorio, F. Salgado, J. Toledo).

Gaviota reidora (*Leucophaeus atricilla*): Siempre con pocos registros en el país, dos ejemplares se observan en Mejillones (Reg. Antofagasta) el 03.09 (L.F. Escobar); y uno más es fotografiado en Playa La Rinconada (Reg. Antofagasta) el 21.06 (J. Baeza, J.M. Contreras, C. Moreno).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Gaviotín de corona blanca

Anous minutus

Iquique

(Reg. Tarapacá)

08 de Enero 2020

FOTO: Rodrigo Torrejón

ABAJO-IZQUIERDA:

Gaviotín de pico negro

Gelochelidon nilotica

Mejillones

(Reg. Antofagasta)

22 de Noviembre de 2020

FOTO: Luis Felipe Escobar

DERECHA:

Gaviotín de corona blanca

Anous minutus

Islote González, Islas Desventuradas

(Reg. Valparaíso)

15 de Diciembre 2020

FOTO: Rodrigo González



Gaviotín de San Félix (*Anous stolidus*): Destaca la observación de un ejemplar en Isla Choros, R.N. Pingüino de Humboldt (Reg. Coquimbo) el 21 y 24.01 (J. Arriagada), correspondiendo al tercer registro continental conocido para esta especie en Chile. Un detalle de este registro se publicó como artículo en **La Chiricoca 26**: «Presencia de Gaviotín de San Félix en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt».

Gaviotín de pico negro (*Gelochelidon nilotica*): Un ejemplar se observa en Mejillones (Reg. Antofagasta) el 22.11 (J. Baeza, G. Cassus, L.F. Escobar, M. Gutiérrez, C. Moreno), correspondiendo al registro más austral conocido para esta especie en Chile.

Gaviotín de corona blanca (*Anous minutus*): Un ejemplar es observado en un barco recalado cerca de la boya de la Esmeralda en Iquique (Reg. Tarapacá), entre el 19.12.2019 y el 08.01.2020 (R. Torrejón), siendo el primer registro informado para Chile continental. Por otro lado, 6 ejemplares (entre juveniles y adultos) se registran en el Islote González, archipiélago de las Islas Desventuradas (Reg. Valparaíso) el 15.12 (R. González). Un año antes (11.12.2019), se encontró una pequeña población reproductora en la isla San Ambrosio del mismo archipiélago, con ocho nidos de esta especie entre 50-60 nidos de **Gaviotín de San Félix** (*Anous stolidus*), correspondiendo a la población reproductora más al sureste de esta especie en el Pacífico y al primer registro documentado de este gaviotín en el país. Más detalles de este notable descubrimiento se pueden leer en el artículo: Marín, M; R. González & S. Trucco. 2001. The Black Noddy *Anous minutus*: a new breeding species for Chile. *Marine Ornithology* 49: 79-82.

IZQUIERDA:

Pingüino rey

Aptenodytes patagonicus

Playa de Bucalemu

(Reg. O'Higgins)

22 de Enero 2020

FOTO: Diego Peñaloza



DERECHA:

Pingüino de penacho amarillo

Eudyptes chrysocome

Playa La Boca, Concón

(Reg. Valparaíso)

Enero 2020

FOTO: J.L. Brito.



Pingüino rey (*Aptenodytes patagonicus*): Nuevamente aparece un individuo de esta especie en la costa de Chile central, esta vez en la playa de Bucalemu, comuna de Paredones (Reg. O'Higgins) el 22.01 (información D. Peñaloza), siendo atendido por personal de Sernapesca y liberado dos días después en el Islote Pupuya, Caleta Matanzas, en la misma Región.

Pingüino de penacho amarillo (*Eudyptes chrysocome*): Lejos de su rango regular en Chile, un ejemplar está presente en Playa La Boca, Concón (Reg. Valparaíso) a fines de enero 2020 (información J.L. Brito).

ARRIBA-IZQUIERDA:

Albatros de frente blanca

Thalassarche cauta

Pelágico frente a Valparaíso
(Reg. Valparaíso)

11 de Enero 2020

FOTO: Fernando Díaz

ABAJO-IZQUIERDA:

Albatros de las Galápagos

Phoebastria irrorata

Pelágico frente a Quintero
(Reg. Valparaíso)

02 de Marzo 2020

FOTO: Rodrigo Ortega

ARRIBA-DERECHA:

Albatros oscuro

Phoebastria fusca

Estrecho de Magallanes
(Reg. Magallanes)

14 de Marzo 2020

FOTO: Marcin Horbatowski

ABAJO-DERECHA:

Golondrina de mar de cara blanca

Pelagodroma marina

25 millas frente a Guayusca,
Purranque (Reg. Los Lagos)

25 de Febrero 2020

FOTO: Kirk Zufelt



Albatros de frente blanca (*Thalassarche cauta*): Un ejemplar es registrado en una salida pelágica frente a Valparaíso (Reg. Valparaíso) el 11.01 (F. Díaz, A. Mack, C. Moreno, M. Olivares).

Albatros oscuro (*Phoebastria fusca*): Destaca la observación de un ejemplar en el cruce del Estrecho de Magallanes (Reg. Magallanes), el 14.03 (M. Horbatowski), correspondiendo al tercer registro con evidencia para esta especie en Chile.

Albatros de las Galápagos (*Phoebastria irrorata*): Un ejemplar es fotografiado en una salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso) el 02.03 (N. Araya, R. Ortega, R. Reyes).

Golondrina de mar de cara blanca (*Pelagodroma marina*): Con siempre pocos registros en el país, un ejemplar es fotografiado 25 millas náuticas frente a Guayusca, Purranque (Reg. Los Lagos) el 25.02 (K. Zufelt).

ARRIBA:

Cigüeña de cabeza pelada

Mycteria americana

Santa Fe, Los Ángeles

(Reg. Biobío)

12 de Abril 2020

FOTO: Jorge Galaz

ABAJO:

Cigüeña de cabeza pelada

Mycteria americana

Los Nogales, Camarico

(Reg. Coquimbo)

27 de Julio 2020

FOTO: Ana Alayan



Cigüeña de cabeza pelada (*Mycteria americana*): Nuevamente en un tranque de regadío en Los Nogales, Camarico (Reg. Coquimbo), es fotografiado un ejemplar el 27.07 (A. Alayan), probablemente el mismo individuo reportado en el «Resumen de Avistamientos» de **La Chiricoca 26**; y sorprende la observación de otro ejemplar en Santa Fe, Los Ángeles (Reg. Biobío), entre el 12 y 18.04 (J. Galaz), correspondiendo este último al cuarto registro de la especie en el país.

ARRIBA-IZQUIERDA:

Piquero de Nazca

Sula granti

Pelágico frente a Quintero
(Reg. Valparaíso)

19 de Diciembre 2020

FOTO: Rodrigo Ortega

ABAJO-IZQUIERDA:

Piquero café

Sula leucogaster

Islote Pájaros 1
(Reg. Coquimbo)

06 de Enero 2020

FOTO: Cristián Pinto

ARRIBA-DERECHA:

Piquero café

Sula leucogaster

Punta Cuartel, Mejillones
(Reg. Antofagasta)

05 de Julio 2020

FOTO: Ana García-Cegarra

ABAJO-DERECHA:

Piquero café

Sula leucogaster

Rocas Negras, Bahía Inglesa
(Reg. Atacama)

22 de Octubre 2020

FOTO: Eduardo Opazo



Piquero de Nazca (*Sula granti*): Destaca la observación de un ejemplar en una salida pelágica frente a Quintero (Reg. Valparaíso) el 19.12 (N. Araya, M. Cisternas, R. Ortega, R. Reyes), correspondiendo al segundo registro de esta especie en Chile.



Piquero de patas azules (*Sula nebouxii*): Se describe una nueva colonia de reproducción de esta especie en el Islote González, archipiélago de las Islas Desventuradas (Reg. Valparaíso), con 6 parejas (2 de ellas con polluelos) observadas el 14 y 15.12. Más detalles de estos registros se pueden leer en el artículo: Marín, M. & R. González. 2021. A new breeding colony of Blue-footed Booby *Sula nebouxii* at Islote González, Archipelago Islas Desventuradas, Chile. *Marine Ornithology* 49: 189–192.

Piquero café (*Sula leucogaster*): Un ejemplar se registra en Punta Cuartel, Mejillones (Reg. Antofagasta) el 05.07 (A. García-Cegarra); otro más se observa en Rocas Negras, sur de Bahía Inglesa (Reg. Atacama) el 22.10 (B. Guggiana, E. Opazo); y un tercer ejemplar se reporta en Islote Pájaros 1 (Reg. Coquimbo) el 06.01 (R. Barros, F. Cáceres, H. Norambuena, C. Pinto).

Huairavillo de dorso negro

Ixobrychus exilis

Playa Chinchorro, Arica

(Reg. Arica y Parinacota)

23 de Mayo 2020

FOTO: Verónica Araya



Huairavillo de dorso negro (*Ixobrychus exilis*): Un ejemplar fue encontrado en una construcción cercana a la playa Chinchorro, Arica (Reg. Arica y Parinacota) el 23.05 (V. Araya, G. Pulgar), siendo liberado en la desembocadura del río Lluta, correspondiendo a uno de los pocos registros de esta especie en el país.

ARRIBA-IZQUIERDA:

Saca-tu-real rubinus
Pyrocephalus rubinus rubinus
Las Condes
(Reg. Metropolitana)
16 de Noviembre 2020
FOTO: Arturo Alvestegui



ARRIBA-CENTRO:

Benteveo
Pitangus sulphuratus
Saltos del Laja
(Reg. Biobío)
26 de Enero 2020
FOTO: Hederd Torres



ABAJO:

Pitanguá
Megarynchus pitangua
Palacio de los Picaflones,
San Miguel de Azapa
(Reg. Arica y Parinacota)
08 de Abril 2020
FOTO: Verónica Araya



ARRIBA-DERECHA:

Benteveo rayado
Myiodynastes maculatus solitarius
Ruta A-31, camino a Ticnamar
(Reg. Arica y Parinacota)
04 de Abril 2020
FOTO: Carlos Cullen



Saca-tu-real rubinus (*Pyrocephalus rubinus rubinus*): Un macho es fotografiado en calle La Balandra, Las Condes (Reg. Metropolitana) el 16.11 (A. Alvestegui), correspondiendo a uno de los pocos registros de la subespecie nominal en Chile.

Benteveo (*Pitangus sulphuratus*): Un ejemplar se observa en Talca (Reg. Maule) entre el 26.06 (C. Arriagada); y otro más se registra en los Saltos del Laja (Reg. Biobío) el 25 y 26.01 (F. Undurruga, H. Torres). A este último ejemplar se le observó trasladando plumas como material para un potencial nido.

Pitanguá (*Megarynchus pitangua*): Sorprende la presencia de un ejemplar en el «Palacio de los Picaflones», sector de San Miguel de Azapa, Valle de Azapa (Reg. Arica y Parinacota) el 05 y el 12.04 (J. Fuentes, V. Araya, G. Pulgar), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Benteveo rayado (*Myiodynastes maculatus solitarius*): Un ejemplar juvenil es fotografiado cerca del Km 52 de la Ruta A-31 que une Arica y Ticnamar (Reg. Arica y Parinacota) el 04.04 (C. Cullen), correspondiendo al segundo registro de esta especie en el país. El primero fue un espécimen colectado por Guillermo Millie en Vallenar (Reg. Atacama) el 09 de marzo de 1942.

IZQUIERDA:

Suirirí boreal

Tyrannus tyrannus

Punta de Choros

(Reg. Coquimbo)

26 de Enero 2020

FOTO: Freddy Olivares

DERECHA-ARRIBA:

Suirirí real

Tyrannus melancholicus

Palacio de los Picaflores,

San Miguel de Azapa

(Reg. Arica y Parinacota)

08 de Abril 2020

FOTO: Verónica Araya

DERECHA-ABAJO:

Cazamoscas tijereta

Tyrannus savana

San Fernando

(Reg. O'Higgins)

09 de Febrero 2020

FOTO: Ricardo Oyarzún



Suirirí real (*Tyrannus melancholicus*): Con pocos registros en el país, dos ejemplares son observados en el «Palacio de los Picaflores», sector de San Miguel de Azapa (Reg. Arica y Parinacota) entre el 05 y 12.04 (J. Fuentes, V. Araya, G. Pulgar).

Suirirí boreal (*Tyrannus tyrannus*): Un ejemplar es observado en la desembocadura del río Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 19.01 (P. Medalla); otro más es fotografiado en el km. 23 del Valle de Azapa (Reg. Arica y Parinacota) el 20.12 (C. Moreno); un tercer ejemplar se registra en Pica (Reg. Tarapacá) el 13.11 (J. Figueroa); otro se observa en Baquedano (Reg. Antofagasta) el 07.03 y 29.11 (C. Moreno, J.M. Contreras); y otro más está presente en Punta de Choros (Reg. Coquimbo) entre el 26.01 y 11.02 (P. Dávalos, F. Olivares, C. Vargas).

Cazamoscas tijereta (*Tyrannus savana*): Sorprende el reporte de 10 ejemplares de esta especie en los primeros 3 meses del año: Uno se observa en el km 27 del Valle de Azapa (Reg. Arica y Parinacota) el 03.03 (C. Moreno); otro más en el sector La Cascada del río Loa, al oeste de Calama (Reg. Antofagasta) el 16.03 (E. López); un ejemplar es observado en la Mejillones (Reg. Antofagasta) el 14 y 15.03 (F. Castro, J.M. Contreras, L.F. Escobar, C. Moreno); dos más están presentes en Baquedano (Reg. Antofagasta) el 07.03 (C. Moreno); uno es fotografiado en Diego de Almagro (Reg. Atacama) el 05.03 (J.G. Rojas); uno se observa en la desembocadura del río Choapa (Reg. Coquimbo) el 08.03 (C. Piñones); uno en San Fernando (Reg. O'Higgins) el 09.02 (R. Oyarzún); uno más en Teno (Reg. Maule) el 01.01 (D. Díaz); y un último está presente en el sector del

IZQUIERDA:

Chiví

Vireo chivi

Mejillones

(Reg. Antofagasta)

12 de Marzo 2020

FOTO: Luis Felipe Escobar



Humedal Tres Puentes (Reg. Magallanes) entre el 09 y 13.03 (C. de la Rivera, M. Figueroa, R. Moraga, J.P. Rider, J. Schulmeister, J. Toro, D. Tureo, J. Vidal, D. Villagrán).

Chiví (*Vireo chivi*): Destaca la observación de un ejemplar en Mejillones (Reg. Antofagasta) entre el 12 y 14.03 (L.F. Escobar, F. Castro, C. Moreno), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Verderón de ojos rojos/Chiví (*Vireo olivaceus/chivi*): Se registra un ejemplar en el sector del Km 19 del Valle de Azapa (Reg. Arica y Parinacota) el 07.03 (V. Araya), que a pesar de las fotografías obtenidas, no se puede precisar la especie.

DERECHA-ARRIBA:

Verderón de ojos rojos/Chiví

Vireo olivaceus/chivi

Km 19 del Valle de Azapa

(Reg. Arica y Parinacota)

07 de Marzo 2020

FOTO: Verónica Araya



DERECHA-ABAJO:

Golondrina parda

Progne tapera

Mejillones

(Reg. Antofagasta)

18 de Abril 2020

FOTO: Luis Felipe Escobar



Golondrina parda (*Progne tapera*): Con pocos registros en el país, un ejemplar se observa en el Valle del Lluta (Reg. Arica y Parinacota) el 22.10 (F. González); y nuevamente 1 ejemplar está presente en Mejillones (Reg. Antofagasta) entre el 18 y 22.04, y el 14.10 (L.F. Escobar).

IZQUIERDA:

Estornino pinto

Sturnus vulgaris

Ruta 200, al poniente de Villa
Cerro Castillo (Reg. Magallanes)

21 de octubre 2020

FOTO: Cristian Asun



DERECHA:

Zorzal chalchalero

Turdus amaurochalinus

Peral Ojo de Agua
(Reg. Coquimbo)

01 de Mayo 2020

FOTO: Jorge Velásquez



ABAJO:

Monterita de collar

Microspingus torquatus

Las Quemadas
(Reg. Los Lagos)

17 de Junio 2020

FOTO: Virginia Alvarado



Golondrina grande (*Petrochelidon pyrrhonota*): En el humedal Küla-Kura, Quilicura (Reg. Metropolitana), el 15.11 se encontró un nido activo de esta especie bajo un puente de hormigón (D. Martínez, J. Toledo), confirmándose en las siguientes semanas la presencia de tres pollos, lo que confirma la reproducción exitosa de esta especie en Chile. Más detalles sobre este episodio de reproducción se pueden leer en un artículo de este mismo número de **La Chiricoca** (pág. 16).

Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*): Un ejemplar es registrado en la Ruta Y 200, al poniente de Villa Cerro Castillo (Reg. Magallanes) el 21.10 (C. Asun), correspondiendo al tercer registro conocido para esta especie en el país, y el segundo con evidencia. Más detalles sobre los registros de esta especie en Chile se pueden leer en un artículo de este mismo número de **La Chiricoca** (pág. 27).

Zorzal chalchalero (*Turdus amaurochalinus*): Un ejemplar es observado en Peral Ojo de Agua (Reg. Coquimbo) entre el 01 y 09.05 (S. Velásquez, J. Velásquez), correspondiendo a uno de los pocos registros de la especie en el país.

IZQUIERDA:

Tersina

Tersina viridis

Chincolco

(Reg. Valparaíso)

22 de abril 2020

FOTO: Ignacio Yanca

DERECHA:

Naranjero

Pipraeidea bonariensis [Grupo bonariensis]

Antuco

(Reg. Biobío)

01 de Agosto 2020

FOTO: Natacha Sánchez

ABAJO:

Naranjero

Pipraeidea bonariensis [Grupo bonariensis]

Río Bueno

(Reg. Los Ríos)

04 de Agosto 2020

FOTO: Víctor Antillanca



Monterita de collar (*Microspingus torquatus pectoralis*): Es fotografiado un ejemplar en Las Quemadas (Reg. Los Lagos) el 17.06 (V. Alvarado), correspondiendo al primer registro de esta especie en Chile.

Tersina (*Tersina viridis*): Un macho juvenil es fotografiado en Chincolco (Reg. Valparaíso) el 22.04 (I. Yanca), correspondiendo al segundo registro de esta especie en el país.

Naranjero (*Pipraeidea bonariensis*) Grupo bonariensis: Destaca la observación de un macho en Antuco (Reg. Biobío) el 01.08 (N. Sánchez); y otro más en Río Bueno (Reg. Los Ríos) entre el 04.08 y 03.09 (V. Antillanca, F. Cantero), correspondiendo al tercer y cuarto registro respectivamente para un ejemplar del Grupo bonariensis en el país.



La Chiricoca

JULIO DE 2021

Santiago de Chile

lachiricoca@redobservadores.cl

www.redobservadores.cl